

魚介類の分析結果<福島第一原子力発電所20km圏内> (γ)

(1/6)

| 採取地点 | 試料名 (部位) | 採取日 | 分析項目 | | |
|-------------------|-------------|-----------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | | Cs-134 (Bq/kg(生)) | Cs-137 (Bq/kg(生)) | Cs合計 (Bq/kg(生)) |
| 太田川沖合1km付近(T-S1) | アカエイ(筋肉) | 2023/2/9 | < 3.5E+00 | < 3.9E+00 | ND |
| 太田川沖合1km付近(T-S1) | クロソイ(筋肉) | 2023/2/9 | < 3.1E+00 | < 3.4E+00 | ND |
| 太田川沖合1km付近(T-S1) | マコガレイ(筋肉) | 2023/2/9 | < 3.6E+00 | < 3.4E+00 | ND |
| 太田川沖合1km付近(T-S1) | ムシガレイ(筋肉) | 2023/2/9 | < 3.3E+00 | < 3.8E+00 | ND |
| 太田川沖合1km付近(T-S1) | メイタガレイ(筋肉) | 2023/2/9 | < 3.0E+00 | < 3.7E+00 | ND |
| 小高区沖合3 km付近(T-S2) | マコガレイ(筋肉) | 2023/2/9 | < 3.3E+00 | < 3.5E+00 | ND |
| 小高区沖合3 km付近(T-S2) | ムシガレイ(筋肉) | 2023/2/9 | < 3.4E+00 | < 3.0E+00 | ND |
| 請戸川沖合3 km付近(T-S3) | カスザメ(筋肉) | 2023/2/10 | < 3.1E+00 | 3.7E+00 | 3.7E+00 |
| 請戸川沖合3 km付近(T-S3) | コモンカスベ(筋肉) | 2023/2/10 | < 4.3E+00 | < 3.9E+00 | ND |
| 請戸川沖合3 km付近(T-S3) | マコガレイ(筋肉) | 2023/2/10 | < 2.7E+00 | < 3.8E+00 | ND |

- ・核種毎の半減期：Cs-134(約2年)，Cs-137(約30年)
 - ・不等号(<：小なり)は、検出限界値未満(ND)を表す。
 - ・基準値(2012年4月1日以降)Cs-134、Cs-137の合計：1.0E+02Bq/kg。
 - ・分析機関：東京パワーテクノロジー(株)
 - ・○.○E±○とは、○.○×10^{±○}であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は3.1×10¹で31，3.1E+00は3.1×10⁰で3.1，3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

魚介類の分析結果 <福島第一原子力発電所20km圏内> (γ)

(2/6)

| 採取地点 | 試料名 (部位) | 採取日 | 分析項目 | | |
|----------------------|-------------|-----------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | | Cs-134 (Bq/kg(生)) | Cs-137 (Bq/kg(生)) | Cs合計 (Bq/kg(生)) |
| 1 F敷地沖合 3 km付近(T-S4) | コモンカスベ(筋肉) | 2023/2/10 | < 3.3E+00 | < 4.1E+00 | ND |
| 1 F敷地沖合 3 km付近(T-S4) | ヒラメ(筋肉)No.1 | 2023/2/10 | < 3.3E+00 | < 3.5E+00 | ND |
| 1 F敷地沖合 3 km付近(T-S4) | ホウボウ(筋肉) | 2023/2/10 | < 4.2E+00 | < 3.3E+00 | ND |
| 木戸川沖合 2 km付近(T-S5) | コモンカスベ(筋肉) | 2023/2/24 | < 3.8E+00 | < 4.0E+00 | ND |
| 木戸川沖合 2 km付近(T-S5) | ババガレイ(筋肉) | 2023/2/24 | < 3.2E+00 | < 2.7E+00 | ND |
| 木戸川沖合 2 km付近(T-S5) | ヒラメ(筋肉)No.1 | 2023/2/24 | < 3.3E+00 | < 3.4E+00 | ND |
| 木戸川沖合 2 km付近(T-S5) | マダイ(筋肉) | 2023/2/24 | < 3.4E+00 | < 4.0E+00 | ND |
| 木戸川沖合 2 km付近(T-S5) | ムシガレイ(筋肉) | 2023/2/24 | < 4.0E+00 | < 3.3E+00 | ND |
| 2 F敷地沖合 2 km付近(T-S7) | ババガレイ(筋肉) | 2023/2/24 | < 4.0E+00 | < 3.9E+00 | ND |
| 2 F敷地沖合 2 km付近(T-S7) | ヒラメ(筋肉)No.1 | 2023/2/24 | < 3.5E+00 | < 3.1E+00 | ND |

- ・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
- ・不等号(< : 小なり)は、検出限界値未満(ND)を表す。
- ・基準値(2012年4月1日以降)Cs-134、Cs-137の合計：1.0E+02Bq/kg。
- ・分析機関：東京パワーテクノロジー(株)
- ・○.○E±○とは、○.○×10^{±○}であることを意味する。
(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

魚介類の分析結果<福島第一原子力発電所20km圏内> (γ)

(3/6)

| 採取地点 | 試料名 (部位) | 採取日 | 分析項目 | | |
|--------------------|-------------|-----------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | | Cs-134 (Bq/kg(生)) | Cs-137 (Bq/kg(生)) | Cs合計 (Bq/kg(生)) |
| 2F敷地沖合2km付近(T-S7) | ムシガレイ(筋肉) | 2023/2/24 | < 3.9E+00 | < 3.4E+00 | ND |
| 小高区沖合1.5km付近(T-B1) | アイナメ(筋肉) | 2023/2/28 | < 4.3E+00 | < 3.5E+00 | ND |
| 小高区沖合1.5km付近(T-B1) | カナガシラ(筋肉) | 2023/2/28 | < 3.5E+00 | < 3.5E+00 | ND |
| 小高区沖合1.5km付近(T-B1) | キアンコウ(全体) | 2023/2/28 | < 3.5E+00 | < 3.8E+00 | ND |
| 小高区沖合1.5km付近(T-B1) | コモンカスベ(筋肉) | 2023/2/28 | < 2.9E+00 | < 3.6E+00 | ND |
| 小高区沖合1.5km付近(T-B1) | スズキ(筋肉) | 2023/2/28 | < 3.8E+00 | < 4.5E+00 | ND |
| 小高区沖合1.5km付近(T-B1) | ババガレイ(筋肉) | 2023/2/28 | < 3.4E+00 | < 3.3E+00 | ND |
| 小高区沖合1.5km付近(T-B1) | ヒラメ(筋肉)No.1 | 2023/2/28 | < 5.1E+00 | < 5.7E+00 | ND |
| 小高区沖合1.5km付近(T-B1) | ヒラメ(筋肉)No.2 | 2023/2/28 | < 3.4E+00 | < 3.8E+00 | ND |
| 小高区沖合1.5km付近(T-B1) | ムシガレイ(筋肉) | 2023/2/28 | < 3.3E+00 | < 3.1E+00 | ND |

- ・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
- ・不等号(<：小なり)は、検出限界値未満(ND)を表す。
- ・基準値(2012年4月1日以降)Cs-134、Cs-137の合計：1.0E+02Bq/kg。
- ・分析機関：東京パワーテクノロジー(株)
- ・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

魚介類の分析結果<福島第一原子力発電所20km圏内> (γ)

(4/6)

| 採取地点 | 試料名 (部位) | 採取日 | 分析項目 | | |
|--------------------|--------------|-----------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | | Cs-134 (Bq/kg(生)) | Cs-137 (Bq/kg(生)) | Cs合計 (Bq/kg(生)) |
| 請戸川沖合18km付近(T-B2) | カナガシラ(筋肉) | 2023/2/28 | < 4.1E+00 | < 3.8E+00 | ND |
| 請戸川沖合18km付近(T-B2) | キアンコウ(全体) | 2023/2/28 | < 4.2E+00 | < 3.6E+00 | ND |
| 請戸川沖合18km付近(T-B2) | スズキ(筋肉) | 2023/2/28 | < 3.3E+00 | < 3.3E+00 | ND |
| 請戸川沖合18km付近(T-B2) | ヒラメ(筋肉)No.1 | 2023/2/28 | < 3.9E+00 | < 3.7E+00 | ND |
| 請戸川沖合18km付近(T-B2) | マサバ(筋肉) | 2023/2/28 | < 3.4E+00 | < 3.3E+00 | ND |
| 請戸川沖合18km付近(T-B2) | ムシガレイ(筋肉) | 2023/2/28 | < 3.7E+00 | < 3.1E+00 | ND |
| 請戸川沖合18km付近(T-B2) | メイタガレイ(筋肉) | 2023/2/28 | < 3.2E+00 | < 3.3E+00 | ND |
| 請戸川沖合18km付近(T-B2) | ヤナギムシガレイ(筋肉) | 2023/2/28 | < 3.5E+00 | < 3.7E+00 | ND |
| 1F敷地沖合10km付近(T-B3) | カナガシラ(筋肉) | 2023/2/22 | < 4.7E+00 | < 4.0E+00 | ND |
| 1F敷地沖合10km付近(T-B3) | クロソイ(筋肉) | 2023/2/22 | < 3.0E+00 | < 3.4E+00 | ND |

- ・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
- ・不等号(<：小なり)は、検出限界値未満(ND)を表す。
- ・基準値(2012年4月1日以降)Cs-134、Cs-137の合計：1.0E+02Bq/kg。
- ・分析機関：東京パワーテクノロジー(株)
- ・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

魚介類の分析結果 <福島第一原子力発電所20km圏内> (γ)

(5/6)

| 採取地点 | 試料名 (部位) | 採取日 | 分析項目 | | |
|-------------------------|-------------|-----------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | | Cs-134 (Bq/kg(生)) | Cs-137 (Bq/kg(生)) | Cs合計 (Bq/kg(生)) |
| 1 F 敷地沖合 10 km 付近(T-B3) | コモンカスベ(筋肉) | 2023/2/22 | < 3.7E+00 | < 3.4E+00 | ND |
| 1 F 敷地沖合 10 km 付近(T-B3) | ショウサイフグ(筋肉) | 2023/2/22 | < 3.6E+00 | < 3.4E+00 | ND |
| 1 F 敷地沖合 10 km 付近(T-B3) | スズキ(筋肉) | 2023/2/22 | < 3.7E+00 | < 2.9E+00 | ND |
| 1 F 敷地沖合 10 km 付近(T-B3) | ヒラメ(筋肉)No.1 | 2023/2/22 | < 3.4E+00 | < 4.8E+00 | ND |
| 1 F 敷地沖合 10 km 付近(T-B3) | ホウボウ(筋肉) | 2023/2/22 | < 2.9E+00 | < 3.8E+00 | ND |
| 1 F 敷地沖合 10 km 付近(T-B3) | ホシザメ(筋肉) | 2023/2/22 | < 3.6E+00 | < 3.7E+00 | ND |
| 1 F 敷地沖合 10 km 付近(T-B3) | マダイ(筋肉) | 2023/2/22 | < 3.3E+00 | < 3.5E+00 | ND |
| 1 F 敷地沖合 10 km 付近(T-B3) | ムシガレイ(筋肉) | 2023/2/22 | < 3.5E+00 | < 3.2E+00 | ND |
| 2 F 敷地沖合 10 km 付近(T-B4) | カナガシラ(筋肉) | 2023/2/22 | < 3.1E+00 | < 3.9E+00 | ND |
| 2 F 敷地沖合 10 km 付近(T-B4) | キアンコウ(全体) | 2023/2/22 | < 3.9E+00 | < 3.9E+00 | ND |

- ・核種毎の半減期：Cs-134(約2年)，Cs-137(約30年)
 - ・不等号(<：小なり)は、検出限界値未満(ND)を表す。
 - ・基準値(2012年4月1日以降)Cs-134、Cs-137の合計：1.0E+02Bq/kg。
 - ・分析機関：東京パワーテクノロジー(株)
 - ・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は3.1×10¹で31，3.1E+00は3.1×10⁰で3.1，3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

魚介類の分析結果<福島第一原子力発電所20km圏内> (γ)

(6/6)

| 採取地点 | 試料名 (部位) | 採取日 | 分析項目 | | |
|---------------------------|-------------|-----------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | | Cs-134 (Bq/kg(生)) | Cs-137 (Bq/kg(生)) | Cs合計 (Bq/kg(生)) |
| 2 F 敷地沖合 1 0 k m 付近(T-B4) | ショウサイフグ(筋肉) | 2023/2/22 | < 3.5E+00 | < 3.1E+00 | ND |
| 2 F 敷地沖合 1 0 k m 付近(T-B4) | スズキ(筋肉) | 2023/2/22 | < 3.3E+00 | < 3.1E+00 | ND |
| 2 F 敷地沖合 1 0 k m 付近(T-B4) | ソウハチ(筋肉) | 2023/2/22 | < 3.8E+00 | < 3.4E+00 | ND |
| 2 F 敷地沖合 1 0 k m 付近(T-B4) | ババガレイ(筋肉) | 2023/2/22 | < 3.1E+00 | < 3.9E+00 | ND |
| 2 F 敷地沖合 1 0 k m 付近(T-B4) | ヒラメ(筋肉)No.1 | 2023/2/22 | < 3.7E+00 | < 4.0E+00 | ND |
| 2 F 敷地沖合 1 0 k m 付近(T-B4) | ヒラメ(筋肉)No.2 | 2023/2/22 | < 6.3E+00 | < 5.1E+00 | ND |
| 2 F 敷地沖合 1 0 k m 付近(T-B4) | ホウボウ(筋肉) | 2023/2/22 | < 3.3E+00 | < 3.2E+00 | ND |
| 2 F 敷地沖合 1 0 k m 付近(T-B4) | ホシザメ(筋肉) | 2023/2/22 | < 3.1E+00 | < 3.8E+00 | ND |
| 2 F 敷地沖合 1 0 k m 付近(T-B4) | マダイ(筋肉) | 2023/2/22 | < 3.8E+00 | < 3.5E+00 | ND |
| 2 F 敷地沖合 1 0 k m 付近(T-B4) | メイタガレイ(筋肉) | 2023/2/22 | < 3.9E+00 | < 3.7E+00 | ND |

- ・核種毎の半減期：Cs-134(約2年)，Cs-137(約30年)
- ・不等号(<：小なり)は、検出限界値未満(ND)を表す。
- ・基準値(2012年4月1日以降)Cs-134、Cs-137の合計：1.0E+02Bq/kg。
- ・分析機関：東京パワーテクノロジー(株)
- ・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31，3.1E+00は3.1×10⁰で3.1，3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

魚介類の分析結果<福島第一原子力発電所20km圏内>(γ)

(1/1)

| 採取地点 | 試料名 (部位) | 採取日 | 分析項目 | | |
|-----------------|-------------|-----------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | | Cs-134 (Bq/kg(生)) | Cs-137 (Bq/kg(生)) | Cs合計 (Bq/kg(生)) |
| 熊川沖合4km付近(T-S8) | スズキ(筋肉) | 2023/3/10 | < 3.8E+00 | < 4.2E+00 | ND |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

- ・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
 - ・不等号(< : 小なり)は、検出限界値未満(ND)を表す。
 - ・基準値(2012年4月1日以降)Cs-134、Cs-137の合計：1.0E+02Bq/kg。
 - ・分析機関：東京パワーテクノロジー(株)
 - ・○.○E±○とは、○.○×10^{±○}であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

魚介類分析結果<福島第一原子力発電所20km圏内>(H-3)

| 採取地点 | 試料名 (部位) | 採取日 | 分析項目 | | | | 参考 Cs合計 (Bq/kg(生)) | 試料名 | 採取日 | 参考 H-3 (Bq/L) |
|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------|
| | | | H-3(Bq/L) | | H-3(Bq/kg(生)) | | | | | |
| | | | 組織自由水型 | 有機結合型 | 組織自由水型 | 有機結合型 | | | | |
| 太田川沖合1km付近 (T-S1) ^{※2} | ヒラメ(筋肉) | 2022/9/30 | 1.1E-01 | < 2.4E-01 | 8.5E-02 | < 2.8E-02 | ND | 海水 | 2022/9/29 | 1.1E-01 |
| 小高区沖合3km付近 (T-S2) ^{※2} | - | - | - | - | - | - | - | 海水 | 2022/9/29 | 9.8E-02 |
| 請戸川沖合3km付近 (T-S3) ^{※2} | - | - | - | - | - | - | - | 海水 | 2022/9/6 | 1.5E-01 |
| 1F敷地沖合3km付近 (T-S4) ^{※2} | - | - | - | - | - | - | - | 海水 | 2022/9/6 | 9.3E-02 |
| 木戸川沖合2km付近 (T-S5) ^{※2} | ヒラメ(筋肉) | 2022/9/15 | < 7.5E-02 | < 2.7E-01 | < 5.8E-02 | < 3.8E-02 | ND | 海水 | 2022/9/14 | 1.2E-01 |
| 2F敷地沖合2km付近 (T-S7) ^{※2} | ヒラメ(筋肉) | 2022/9/15 | _ ^{※4} | _ ^{※4} | _ ^{※4} | _ ^{※4} | ND | 海水 | 2022/9/14 | < 3.2E-01 |
| 熊川沖合4km付近 (T-S8) ^{※1} | ヒラメ(筋肉) | 2022/9/13 | 8.6E-02 | < 2.7E-01 | 6.7E-02 | < 4.1E-02 | ND | 海水 | 2022/9/12 | 9.3E-02 |
| 小高区沖合15km付近 (T-B1) | - | - | - | - | - | - | - | 海水 | 2022/9/13 | < 3.2E-01 |
| 請戸川沖合18km付近 (T-B2) | - | - | - | - | - | - | - | 海水 | 2022/9/13 | < 3.2E-01 |
| 1F敷地沖合10km付近 (T-B3) | - | - | - | - | - | - | - | 海水 | 2022/9/27 | < 3.3E-01 |
| 2F敷地沖合10km付近 (T-B4) | - | - | - | - | - | - | - | 海水 | 2022/9/27 | < 3.3E-01 |
| ・ 海水の採取深度は表層 ・ 核種毎の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年) ・ 不等号(<)は、検出限界値未満(ND)を表す。 ・ 採取中止および採取できなかった場合、ならびに試料量不足により分析中止の項目は「-」と記す。 ・ ○.○E±○とは、○.○×10 ^{±○} であることを意味する。 (例) 3.1E+01は3.1×10 ¹ で31, 3.1E+00は3.1×10 ⁰ で3.1, 3.1E-01は3.1×10 ⁻¹ で0.31と読む。 ・ 基準値(2012年4月1日以降)Cs-134, Cs-137の合計：1.0E+02Bq/kg。 ・ 組織自由水型トリチウムとは、動植物の組織内に水の状態が存在し、水と同じように組織外へ排出されるトリチウム。 有機結合型トリチウムとは、動植物の組織内のタンパク質などに有機的に結合して組織内に取り込まれ、細胞の代謝により組織外へ排出されるトリチウム。 ・ 分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」を参照 https://www.tepco.co.jp/press/report/ ※1 分析機関：(一財)九州環境管理協会 ※2 分析機関：(株)化研 ※3 WHOの飲料水水質ガイドラインにおける、H-3の指標 ※4 2022年8月以降手順の見直しを実施。改善された手順による再分析に必要な試料量が残っていないため分析中止。 | | | | | | | | WHOの飲料水水質ガイドライン ^{※3} | 1.0E+04 | |

魚介類分析結果<福島第一原子力発電所20km圏内>(H-3)

| 採取地点 | 試料名 (部位) | 採取日 | 分析項目 | | | | 参考 Cs合計 (Bq/kg(生)) | 試料名 | 採取日 | 参考 H-3 (Bq/L) |
|---|-------------|------------|-----------|-----------|---------------|-----------|--------------------------|-------------------------------|------------|---------------------|
| | | | H-3(Bq/L) | | H-3(Bq/kg(生)) | | | | | |
| | | | 組織自由水型 | 有機結合型 | 組織自由水型 | 有機結合型 | | | | |
| 太田川沖合1km付近 (T-S1) ^{※2} | ヒラメ(筋肉) | 2022/11/9 | 分析中 | 分析中 | 分析中 | 分析中 | ND | 海水 | 2022/11/8 | 1.3E-01 |
| 小高区沖合3km付近 (T-S2) ^{※2} | ヒラメ(筋肉) | 2022/11/9 | 1.6E-01 | < 2.6E-01 | 1.2E-01 | < 3.8E-02 | ND | 海水 | 2022/11/8 | 1.4E-01 |
| 請戸川沖合3km付近 (T-S3) ^{※2} | ヒラメ(筋肉) | 2022/11/17 | 分析中 | 分析中 | 分析中 | 分析中 | ND | 海水 | 2022/11/16 | 1.2E-01 |
| 1F敷地沖合3km付近 (T-S4) ^{※2} | ヒラメ(筋肉) | 2022/11/17 | 分析中 | 分析中 | 分析中 | 分析中 | ND | 海水 | 2022/11/16 | < 7.1E-02 |
| 木戸川沖合2km付近 (T-S5) ^{※2} | ヒラメ(筋肉) | 2022/11/9 | 分析中 | 分析中 | 分析中 | 分析中 | ND | 海水 | 2022/11/8 | 1.5E-01 |
| 2F敷地沖合2km付近 (T-S7) ^{※1} | ヒラメ(筋肉) | 2022/11/9 | 6.9E-02 | < 2.8E-01 | 5.2E-02 | < 4.3E-02 | ND | 海水 | 2022/11/8 | < 3.1E-01 |
| 熊川沖合4km付近 (T-S8) ^{※1} | ヒラメ(筋肉) | 2022/12/8 | 分析中 | 分析中 | 分析中 | 分析中 | ND | 海水 | 2022/12/7 | 6.3E-02 |
| 小高区沖合15km付近 (T-B1) ^{※2} | ヒラメ(筋肉) | 2022/12/6 | 分析中 | 分析中 | 分析中 | 分析中 | ND | 海水 | 2022/12/6 | < 3.2E-01 |
| 請戸川沖合18km付近 (T-B2) | — | — | — | — | — | — | — | 海水 | 2022/12/6 | < 3.2E-01 |
| 1F敷地沖合10km付近 (T-B3) | — | — | — | — | — | — | — | 海水 | — | — |
| 2F敷地沖合10km付近 (T-B4) | — | — | — | — | — | — | — | 海水 | — | — |
| ・海水の採取深度は表層 ・核種毎の半減期：H-3(約12年)，Cs-134(約2年)，Cs-137(約30年) ・不等号(<：小なり)は，検出限界値未満(ND)を表す。 ・採取中止および採取できなかった場合，ならびに試料量不足により分析中止の項目は「-」と記す。 ・○.○E±○とは，○.○×10 ^{±○} であることを意味する。 (例) 3.1E+01は3.1×10 ¹ で31，3.1E+00は3.1×10 ⁰ で3.1，3.1E-01は3.1×10 ⁻¹ で0.31と読む。 ・基準値(2012年4月1日以降)Cs-134，Cs-137の合計：1.0E+02Bq/kg。 ・組織自由水型トリチウムとは，動植物の組織内に水の状態で存在し，水と同じように組織外へ排出されるトリチウム。 有機結合型トリチウムとは，動植物の組織内のタンパク質などに有機的に結合して組織内に取り込まれ，細胞の代謝により組織外へ排出されるトリチウム。 ・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」を参照 https://www.tepco.co.jp/press/report/ | | | | | | | | WHOの飲料水水質ガイドライン ^{※3} | | 1.0E+04 |

※1 分析機関：(一財)九州環境管理協会
 ※2 分析機関：(株)化研
 ※3 WHOの飲料水水質ガイドラインにおける，H-3の指標